





POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

PICARDIE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n° 18 du 12 août 2002 - 01 page

Pomme de Terre

Phénologie

<u>Stade</u> : Grossissement des tubercules, fin floraison pour des variétés de fécule.
Le défanage se poursuit sur les variétés de consommation.

Mildiou

Le coin des modèles

Les fréquents passages pluvieux de la semaine dernière ont réactivé la maladie.
Des contaminations ont été enregistrées presque tous les jours et les sorties de taches correspondantes ont eu lieu à partir du 10.

La réserve de spores est assez importante :

Situation épidémiologique poste par poste
(d'après Guntz-Divoux)

Postes climatiques	Génération	Date der. Contaminations	Date prévue de sortie de tache	Potentiel de sporulation
Amiens (Boves)	9ème	6-7 et 10/08	à partir du 13	fort
Attilly	12ème	6 au 10/08	à partir du 13	fort
Ebouleau	11ème	6 au 10/08	à partir du 13	moyen
Forté	11ème	6 au 10/08	à partir du 13	fort
Froidmont	12ème	6,7,8 et 10/08	à partir du 13	moyen
Inval	11ème	6 au 10/08	à partir du 13	fort
Marcelcave	12ème	6 au 10/08	à partir du 13	fort
St Just	10ème	6 au 9/08	à partir du 13	fort
Vauvillers	13ème	6 au 10/08	à partir du 13	fort
Verdilly	10ème	7,9 et 10/08	à partir du 14	moyen
Vic sur Aisne	9ème	6,7,9 et 10/08	à partir du 13	moyen
Villeroy	Pbe technique			
Villiers le Sec	11ème	6 au 10/08	à partir du 13	moyen
Villers Bocage	13ème	6 au 10/08	à partir du 13	fort

Prévisions climatiques

La semaine débutera sous des hospices plus cléments. Un temps plus estival est annoncé cette semaine par Météo France. Attention à la présence de brumes matinales.

<u>*Appui à l'interprétation du modèle*</u>
Le potentiel de sporulation reste élevé. Par conséquent, **il convient de maintenir une protection soignée**.

Préconisations pour les parcelles que l'on veut maintenir en végétation

TOUTES VARIETES

▶ ***Poursuivez un renouvellement à 7 jours avec un dithiocarbamate à 1600 g de m.a. notamment si la protection a été défectueuse la semaine dernière.***
Le prochain traitement pourra être décalé si le beau temps s'installe 3 à 4 jours au moins.

Préconisations pour les parcelles où la date de défanage est proche

<u>TOUTES VARIETES</u>

▶ ***Dans le cas où des symptômes de mildiou ont été observés, préférez l'emploi des produits type fluazinam (SHIRLAN) ou cyazofamide (RANMAN). Ces produits permettent de minimiser les attaques de mildiou sur tubercules. Un renouvellement à 7 jours est conseillé.***
▶ ***Dans le cas contraire, maintenez une protection avec un mancozèbe.***



Mildiou
Attention aux rosées du matin, elles entretiennent les risques.

Ministère de l'Agriculture
Service Régional de la Protection des Végétaux

Allée de la Croix Rompue
518, rue St Fuscien
BP 69
80092 AMIENS
CEDEX 3
Tél : 03.22.33.55.97
Fax : 03.22.33.55.56
E-mail : srpv.draf-picardie@agriculture.gouv.fr
Notre site : www.srpv-picardie.com

Imprimé à la station d'Avertissements Agricoles d'AMIENS
Directeur gérant : Christophe MARTINET
Publication périodique
C.P.P.A.P n°1823AD
ISSN n°07576609

Tarif Courrier 55 €
Tarif Fax 55 €
Tarif E-mail 55 €



